

CRITERIS D'ACTIVACIÓ IMMEDIATA

A	Amenaçada
B	Aturada respiratòria Freqüència Respiratòria <5x' o >36x'
C	Aturada cardíaca Reompliment capil·lar >2" Freqüència Cardíaca <40x' o >140x' Pressió Arterial Sistòlica <90mmHg Dolor toràctic no traumàtic
D	Disminució del nivell de consciència Disminució Glasgow >2 punts Convulsions repetides o perllongades
Altres	Qualsevol pacient que sigui motiu de preocupació

ESCALA DE GLASGOW

OBERTURA OCULAR		RESPOSTA VERBAL		RESPOSTA MOTORA	
ESPONTÀNIA	4	ADECUADA	5	OBEEIX ORDRES	6
A LA ORDRE	3	CONFUSA	4	LOCALITZA DOLOR	5
AL DOLOR	2	INAPROPIADA	3	RETIRADA AL DOLOR	4
NUL·LA	1	SONS INCOMPRESIBLES	2	FLEXIÓ EXTREMITATS	3
		NUL·LA	1	EXTENSIÓ EXTREMITATS	2
				NUL·LA	1

OPUMA

- **O**corregut
- **P**atologies
- **Ú**ltima ingesta
- **M**edicació
- **A**l·lèrgies

SAMPLER

- **S**igne guia
- **A**l·lèrgies
- **M**edicaments
- Antecedents **P**atològics
- Última ingesta (**L**ast Food)
- **E**pisodis previs
- Factors de **R**isc

ALICIA (dolor toràctic)

- **A**parició (sobtada o progressiva)
- **L**ocalització (Retro esternal, epigastri, lateral, punta de costat)
- **I**rradiació (Coll, braç esquerre, epigastri, regió inter-escapular, tot al tòrax).
- **C**aràcter (Opressiu, punxant, cremor).
- **I**ntensitat (Intensa, moderada o lleu).
- **A**tenuants (Repòs, relaxació, ansiolítics, analgèsics, administració de nitrats...)